

# “CAP-POLYPOSIS” – UMA ENTIDADE MUITO RARA – 2 CASOS

Martins D., Sousa P., Pinho J., Araújo R., Machado J., Cancela E.,  
Castanheira A., Ministro P., Silva A.

Serviço de Gastrenterologia  
Diretor de Serviço: Dr. Américo Silva

# ANAMNESE

## Caso 1

▪ ♂, 73 anos


- ANTECEDENTES PESSOAIS:
  - Artrite reumatóide
  - Tromboembolia pulmonar
- Doente seguido em consulta por anemia microcítica ferropénica. Sem queixas gastro-intestinais.
- Pedida pesquisa de sangue oculto nas fezes que foi positiva.
- Efetuada Colonoscopia Total.

## Caso 2




▪ ♂, 78 anos

- ANTECEDENTES PESSOAIS:
  - Hipertensão arterial
  - Diabetes Mellitus tipo 2
- Recurso ao Serviço de Urgência por retorragias, sem outras queixas.
- Analiticamente sem anemia.
- Efetuada Colonoscopia Total.


# ESTUDO COMPLEMENTAR





# ESTUDO COMPLEMENTAR




# ESTUDO COMPLEMENTAR



# ESTUDO COMPLEMENTAR





# ESTUDO COMPLEMENTAR





# ESTUDO COMPLEMENTAR

- Resultado histológico: pseudo-pólipos inflamatórios e componente glandular hiperplásico sem displasia



# ESTUDO COMPLEMENTAR

- Resultado histológico



# “CAP POLYPOSIS”

- Esta condição rara e benigna, descrita pela primeira vez em 1985, caracteriza-se por pólipos inflamatórios revestidos por um “chapéu” branco de tecido de granulação.
- A patogenia é desconhecida, mas pensa-se relacionada com obstipação crónica, prolapso retal ou infeção por *Helicobacter pylori*.
- Os sintomas mais frequentes são: diarreia mucosa, retorragias e tenesmo.

# “CAP POLYPOSIS”

- Geralmente são identificados no reto e cólon sigmoide, mas podem afetar todo o cólon.
- A correção de fatores contribuintes é prioritária. A polipectomia endoscópica é terapêutica de primeira linha.
- Terapêutica médica com anti-inflamatórios esteróides, Metronidazol, Infliximab, terapêutica de erradicação de *H. pylori* mostrou-se eficaz em alguns casos.
- A terapêutica cirúrgica poderá ser válida nos casos refratários.