

XXVIII REUNIÃO ANUAL
Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais Distritais



METÁSTASES INTESTINAIS E CUTÂNEAS DE CARCINOMA DO OVÁRIO

Barbeiro S., Canhoto M., Martins C., Gonçalves C., Cotrim I., Arroja B., Silva F., Vasconcelos H. e Amado C.

Serviço de Gastrenterologia - Centro Hospitalar de Leiria

22 novembro 2013

CASO CLÍNICO

- **Dados de identificação:** mulher, 75 anos, caucasiana, acamada
- **História da doença atual:** **melenas** com 2 dias de evolução
- **Antecedentes:**
 - neoplasia do ovário com carcinomatose peritoneal (2011, terapêutica paliativa)
 - estudo endoscópico digestivo prévio sem alterações (2011)

CASO CLÍNICO

- EXAME OBJETIVO:



EXAMES COMPLEMENTARES

- ANÁLISES:

Hb 8,3 g/dL, VGM 86 fL e HGM 28 pg

Ureia 13,2 mmol/L


Creatinina 0,78 mg/dL

Leucócitos 9100/mm³

PCR 22 mg/dL (<5)


EXAMES COMPLEMENTARES

- EDA:



EXAMES COMPLEMENTARES

- EDA:



HIPÓTESES DE DIAGNÓSTICO


- Úlcera duodenal
- Neoplasia/ lesão metastática

INTERNAMENTO

- Melhoria clínica e analítica
- D3: recorrência das perdas hemáticas: **hematoquécia**



EXAMES COMPLEMENTARES

- COLONOSCOPIA:




EVOLUÇÃO

- BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA E ANALÍTICA




EXAMES COMPLEMENTARES

- EXAME ANATOMOPATOLÓGICO:



LESÕES COMPATÍVEIS COM: METÁSTASES DE CARCINOMA DO OVÁRIO



FOLLOW-UP

- Lesões digestivas não passíveis de resolução definitiva.
- Abordagem dirigida às complicações.

CONCLUSÃO

A via transcelômica é a forma comum de disseminação do carcinoma do ovário, traduzindo-se por carcinomatose peritoneal.

A invasão intestinal ocorre como resultado da extensão direta e invasão transmural a partir da serosa.

A hemorragia digestiva com sede em lesões metastáticas é incomum.