

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR Instantâneo endoscópico

Queirós P., Eliseu L., Sampaio M., Eusébio M., Antunes A.G., Vaz A.M.,
Contente L., Guerreiro H.

Serviço de Gastrenterologia
Centro Hospitalar do Algarve



HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

- Hemorragia diverticular é a causa mais comum de HDB aguda
- Geralmente autolimitada - incomum a observação de hemorragia activa e realização de hemostase endoscópica
- Apresentam-se dois casos de hemorragia diverticular com hemorragia activa

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

CASO 1

■ IDENTIFICAÇÃO

- Sexo masculino, 77 anos, leucodérmico

■ ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

- ICC - Cardiopatia isquêmica com angioplastia e bypass aortocoronario
- DM tipo 2
- HTA
- Dislipidemia

■ MEDICAÇÃO HABITUAL

- CLOPIDOGREL 75mg/dia, IBP, IECA, bloqueador-beta, estatina, diurético

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

■ HISTÓRIA DOENÇA ACTUAL


- Internado por IC descompensada

■ HEMATOQUÉSIAS

- Sangue vivo
- Instalação súbita (ao 8º dia de internamento)
- Instabilidade hemodinâmica
- Descida de hemoglobina de 11,4 g/dl para 7,7 g/dl.

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR


- **COLONOSCOPIA** (<12h)
 - Hemorragia ativa em toalha pulsátil com origem em divertículo do cólon descendente (80cm)



HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

■ COLONOSCOPIA

- Hemorragia controlada eficazmente com injeção de adrenalina e aplicação de 6 endoclips



HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

CASO 2

■ IDENTIFICAÇÃO

- Sexo feminino, 73 anos, leucodérmica

■ ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

- FA crônica
- Doença cerebrovascular (AVC isquêmico prévio)
- HTA

■ MEDICAÇÃO HABITUAL

- VARFARINA, IBP, ARA II, bloqueador-beta, diurético

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

■ HISTÓRIA DOENÇA ACTUAL


- Recorreu ao SU

- **HEMATOQUÉSIAS**

- Sangue vivo
- Instalação súbita
- **Sem** repercussão hemodinâmica
- Descida de hemoglobina de 11 g/dl para 7,9 g/dl
- INR 2,2

HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR


- **ILEOCOLONOSCOPIA (12-24h)**
 - Após ileoscopia → hemorragia ativa em toalha pulsátil com origem em divertículo do cego



HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

■ ILEOCOLONOSCOPIA

- Aplicação de 3 endoclips com redução do débito hemorrágico – sem recorrência de perdas hemáticas



HEMOSTASE ENDOSCÓPICA NA HEMORRAGIA DIVERTICULAR

■ IMPORTÂNCIA

- Visualização endoscópica pouco comum de hemorragia diverticular activa do cólon
- Eficácia da terapêutica endoscópica

OBRIGADO