


XXVIII Reunião Anual NGHD

Invaginação Intestinal de Pólipo Fibróide Inflamatório do Íleon Terminal

Instantâneo Endoscópico



Leitão C., Santos A., Pereira B., Pinto J., Ribeiro H., Caldeira A., Pereira E.
Tristan J., Sousa R., Banhudo A.

Identificação

- **Nome:** V.P.G.P.
- **Gênero:** Feminino
- **Idade:** 69 anos
- **Raça:** Caucasiana
- **Estado Civil:** Casada
- **Naturalidade e Residência:** Castelo Branco

História Clínica



**Serviço
Gastro**

Referenciado para realização de **colonoscopia total** por quadro clínico caracterizado por **dor abdominal difusa** e **alterações do trânsito intestinal** na última semana.

Antecedentes Pessoais

Hipertensão essencial

Status pós diverticulite complicada

Patologia renal

Anti-hipertensores

Sem história familiar significativa


Exame objectivo

Sem alterações

Colonoscopia

No estudo endoscópico, observou-se **pólipo séssil**,
adjacente à **válvula íleo-cecal**, com **superfície erosionada**.


Colonoscopia



Colonoscopia

Enquanto se tentava obter biópsias e com a mudança de **posição**, a respectiva lesão desapareceu.


Colonoscopia



Colonoscopia



Ileoscopia

Realizou-se ileoscopia terminal com identificação do respectivo **pólipo, pediculado, com aproximadamente 12 mm, com superfície erosionada.**



Colonoscopy



Ileoscopy



Colonoscopia

Ileoscopia

Posteriormente, realizaram-se múltiplas biópsias.




Diagnóstico

Histologia

Relatório de Anatomia Patológica

4 fragmentos de **mucosa ileal**, com áreas de atrofia das vilosidades e erosões, mostrando **lâmina própria com tecido fibroinflamatório**. Ausência de **displasia epitelial**.

Pólipo Inflamatório Fibróide do Íleon Terminal



Discussão


Os **tumores benignos do intestino delgado** são entidades clínicas raras e de **crescimento lento**.

O **pólipo inflamatório fibróide do íleon** é um dos seus subtipos.

As lesões podem ser **únicas** ou **múltiplas**.

As **manifestações clínicas** habitualmente associam-se ao **tamanho do tumor**, podendo variar desde **obstrução intermitente** ou **invaginação intestinal**.

Conclusão



Entidade pouco comum

Singularidade da iconografia que demonstra a invaginação intestinal intermitente de pólipos do íleon terminal

Reforçar a necessidade de uma boa inspecção do pólo cecal durante a colonoscopia

Bibliografía

- ❑ Anderson et al. Invaginación intestinal por pólipo fibroide inflamatorio del íleon. Revista Cubana de Medicina 2002; 41(1):39-41.
- ❑ Gonul I et al. Inflammatory fibroid polyp of the ileum causing intussusception: A case report. Turk J Gastroenterol 2004; 15 (1): 59-62.
- ❑ Yoo D. W. A case of giant inflammatory ileal polyp removed by double-balloon enteroscopy. Clin Endosc 2012 Sep;45(3):198-201