



GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA ENDOSCÓPICA (PEG)

ACOMPANHAMENTO E DESPISTE DE COMPLICAÇÕES




❖ Complicações mais frequentes:

- infecção local da pele;
- obstrução do tubo;
- remoção acidental do tubo;
- migração do tubo.



❖ CUIDADOS COM PELE E ESTOMA:

- Lavar as mãos
- Limpar e desinfetar o local
- Não colocar adesivos
- Limpar debaixo do suporte externo da sonda
- Observar a pele á volta
- Não fazer “almofadas” debaixo do suporte




MANUSEAMENTO DA SONDA

- Administrar alimentos com seringa
- Prevenir entupimentos
- Lavar sonda após cada administração
- Clampar sonda
- Não repuxar
- Substituição sonda nas datas previstas
- Se saída da sonda dirigir-se ao hospital



CUIDADOS COM ALIMENTAÇÃO

- Iniciada logo que possível
- Refeições regulares
- Concentração e débito prescrito
- Temperatura adequada



➤ Observar o local de inserção:

- Características da pele e estoma;
- Permeabilidade da sonda;
- Despiste de dificuldades do doente/cuidador;
- Reforçar ensino;
- Encaminhar (médico, dietista, etc).

- TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER COMUNICADA AO MÉDICO/ENFERMEIRO



- ❑ Qualquer alteração deverá ser registada no processo do doente.
- ❑ Se o local de inserção se encontrar com exsudado, é-lhe feito uma colheita em zaragatoa e encaminhada para o laboratório.

