

REMOÇÃO ENDOSCÓPICA DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE

Eusébio, M., Antunes, A.G., Vaz, A.M., Queirós P., Ramos A.,
Caldeira P., Guerreiro H.



Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar do Algarve, EPE

REMOÇÃO ENDOSCÓPICA DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE

- Doente do sexo masculino, 53 anos, sem antecedentes patológicos
- Queixas de epigastralgia e enfiamento pós-prandial com 3 meses de evolução



Endoscopia digestiva alta



REMOÇÃO ENDOSCÓPICA DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE

[Ver Vídeo – clique aqui](#)



REMOÇÃO ENDOSCÓPICA DE BEZOAR GÁSTRICO GIGANTE



- **Endoscopia de controlo normal**

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Bezoares

- Resultam da acumulação e agregação de material não digerido
- Mais frequentemente no estômago
- Na maioria dos casos em doentes submetidos a cirurgia gástrica

- Clinicamente: dor abdominal, náuseas/vômitos, enfartamento

- Várias técnicas de dissolução e fragmentação endoscópica têm sido utilizadas como tratamento

A fragmentação endoscópica de bezoar gástrico de grandes dimensões é um procedimento seguro e eficaz e permite a sua remoção sem necessidade de cirurgia

OBRIGADA
